## Exhibit I

## (12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



## . | NAMES AND THE BOOK OF THE BOOK OF

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 10. Februar 2005 (10.02.2005)

**PCT** 

## $\begin{array}{c} \hbox{(10) Internationale Ver\"{o}ffentlichungsnummer} \\ WO~2005/012316~A3 \end{array}$

(51) Internationale Patentklassifikation <sup>7</sup> : C11B 1/0 C12N 9/02, 9/10, A01K 67/027	2, 103 47 869.8 10. Oktober 2003 (10.10.2003) DE 103 59 593.7 18. Dezember 2003 (18.12.2003) DE
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2004/00795	10 2004 009 457.8 27. Februar 2004 (27.02.2004) DE
(22) Internationales Anmeldedatum: 16. Juli 2004 (16.07.200	10 2004 012 370.5 13. März 2004 (13.03.2004) DE 10 2004 024 014.0 14. Mai 2004 (14.05.2004) DE
(25) Einreichungssprache: Deutsc	ch (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): BASF PLANT SCIENCE GMBH [DE/DE]; Carl-
(26) Veröffentlichungssprache: Deutsc	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
105 55 552.5	(72) Erfinder; und (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): ZANK, Thorsten (76) [DE/DE]; Seckenheimer Str. 4-6, 68165 Mannheim  [Fortsetzung auf der nüchsten Seite]

(54) Title: METHOD FOR THE PRODUCTION OF MULTIPLY-UNSATURATED FATTY ACIDS IN TRANSGENIC ORGANISMS

(54) Bezeichnung: VERFAIIREN ZUR HERSTELLUNG MEHRFACH UNGESÄTTIGTER FETTSÄUREN IN TRANSGENEN

(57) Abstract: The invention relates to a method for the production of multiply-unsaturated fatty acids in an organism, into which nucleic acids have been introduced, which code for polypeptides with  $\Delta$ -5 elongase activity. Said nucleic acid sequences, optionally with further nucleic acid sequences, coding for polypeptides for the biosynthesis of fatty acids and lipid metabolism, are advantageously expressed in the organism. Nucleic acid sequences coding for a  $\Delta$ -6 desaturase, a  $\Delta$ -5 desaturase,  $\Delta$ -4 desaturase and/or Δ-6 elongase activity are particularly advantageous and, advantageously, said saturases and elongases are derived from Thalassiosira, Euglena or Ostreococcus. The invention further relates to a method for the production of oils and/or triacylglycerides with an increased content of long-chain, multiply-unsaturated fatty acids. A particular embodiment of the invention is a method for the production of unsaturated ω-3 fatty acids and a method for the production of triglycerides with an increased content of unsaturated fatty acids, in particular, of  $\Delta$ -3 fatty acids with more than three double bonds. Also disclosed is the production of a transgenic organism, preferably a transgenic plant, or a transgenic microorganism with increased content of ω-3 fatty acids, oils or lipids with ω-3 double bonds as a result of the expression of the elongases and desaturases employed in the above method, preferably in combination with ω-3 desaturases, for example a ω-3 desaturase from fungi of the family Pythiaceae such as the genus Phytophtora, for example, the genus and species Phytophtora infestans, or a  $\omega$ -3 desaturase from algae such as the family Prasinophyceae, for example, the genus Ostreococcus and, particularly, the genus and species Ostreococcus tauri or diatomaceæ such as the genus Thalassiosira and, particularly, the genus and species Thalassiosira pseudonana. The invention also relates to the nucleic acid sequences, nucleic acid constructs, vectors and organisms containing the nucleic acid sequences and/or the nucleic acid constructs and transgenic organisms containing said nucleic acid sequences, nucleic acid constructs and/or vectors. A further part of the invention relates to oils, lipids and/or fatty acids produced according to the above method and use thereof and, furthermore, unsaturated fatty acids and triglycerides with an increased content of unsaturated fatty acids and use thereof.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von mehrfach unge sättigten Fettsäuren in einem Organismus, indem Nukleinsäuren in den Organismus eingebracht werden, die für Polypeptide mit Δ-5-Elongaseaktivität codieren. Vorteilhaft können diese Nukleinsäuresequenzen gegebenenfalls zusammen mit weiteren Nukleinsäuresequenzen, die für Polypeptide der Biosynthese des Fettsäure- oder Lipidstoffwechels codieren, in dem Organismus exprimiert werden. Besonders vorteilhaft sind Nukleinsäuresequenzen, die für eine Δ-6-Desaturase-, eine Δ-5-Desaturase-, Δ-4-Desaturaseund/oder Δ-6-Elongaseaktivität codieren. Vorteilhaft stammen diese Desaturasen und Elongasen aus Thalassiosira, Euglena oder Ostreococcus. Weiterhin betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung von Ölen und/oder Triacylglyceriden mit einem erhöhten Gehalt an langkettigen mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Die vorliegende Erfindung betrifft ausserdem in einer bevorzugten Ausführungsform ein Verfahren zur Herstellung von ungesättigten ω-3 Fettsäuren sowie ein Verfahren zur Herstellung von Triglyceriden mit einem erhöhten Gehalt an ungesättigten Fettsäuren, besonders von ω-3 Fettsäuren mit mehr als drei Doppelbindungen. Die Erfindung betrifft die Herstellung eines transgenen Organismus bevorzugt einer transgenen Pflanze oder eines transgenen Mikroorganismus mit erhöhtem Gehalt an ungesättigten ω-3-Fettsäuren, Ölen oder Lipiden mit ω-3-Doppelbindungen aufgrund der Expression der im erfindungsgemässen Verfahren verwendeten Elongasen und Desaturasen